

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-1-4-80325950

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS

PUBLICATION PERIODIQUE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

EDITION DE LA STATION NORD - PICARDIE

(Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme)

B.P. 355 - 62026 ARRAS CEDEX - Tél. : (21) 23.09.35

BULLETIN n° 174 du 28 MARS 1980

ABONNEMENT ANNUEL : 60,00 F.

Rég. recettes D. D. A.
13, Grand-Place - ARRAS

C.C.P. : 5701.50 LILLE

SPECIAL FEU BACTERIEN

adressé aux arboriculteurs et pépiniéristes

L'enquête annuelle sur la maladie a révélé une nette progression de celle-ci dans le Nord du pays. 9 vergers sont contaminés. La carte située au dos de cette feuille vous permettra de situer la zone contaminée.

Afin de limiter l'extension de la maladie, plusieurs actions doivent être entreprises dès maintenant :

- Un traitement au cuivre à la dose de 250 g/Hl de cuivre métal devra être effectué au stade D (débourrement) sur poiriers et pommiers ainsi que sur toutes rosacées ornementales (sauf sensibilité variétale particulière). Son action préventive créera un milieu défavorable à la pénétration des bactéries notamment lors de la floraison, stade particulièrement sensible.
- Une visite de vos vergers et pépinières avant la floraison
 - . Dans la zone contaminée, et à proximité, il convient d'examiner vos poiriers pour détecter d'éventuels "chancres bactériens". Ils présentent en surface un aspect craquelé et à l'intérieur un aspect humide et luisant avec des stries et plaques rouges sous l'écorce (revoir la plaquette de l'A.C.T.A. qui a dû vous être adressée, sinon nous la demander).
 - . Sur pommiers, les chancres bactériens n'étant pas caractéristiques, il convient d'éliminer systématiquement tous les chancres présents (tailler bien en dessous des dégâts visibles).

Ne pas oublier la désinfection, à l'alcool à brûler, des mains et outils entre chaque manipulation de végétal douteux.

- A partir de la floraison et plus particulièrement dans les zones voisines des régions contaminées, une surveillance attentive de vos vergers et de vos pépinières est impérative. En effet, ces premiers symptômes (noircissement et dessèchement des bouquets floraux suivis d'une progression de la nécrose au niveau du pédoncule et du rameau) sont à l'origine de la généralisation de la maladie dans le verger ou la pépinière.

Nous vous demandons d'expédier rapidement tout symptôme douteux à notre Service de LILLE à l'adresse suivante : MINISTERE DE L'AGRICULTURE - Service de la Protection des Végétaux - A l'attention de Monsieur BALAVOINE - Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. : (20) 52/72/80. Si vous observez un symptôme douteux, n'oubliez pas de marquer l'arbre et la branche dans votre verger et de joindre à votre envoi un bref compte rendu précisant l'importance des dégâts (nombre d'arbres concernés, localisation sur l'arbre...)

D'autres bulletins vous tiendront au courant de l'évolution de la maladie.

C.P.P.A.P. n° 533 A. D.

L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE

Chef de la Circonscription Phytosanitaire

J. PETIOT

CARTE DES CONTAMINATIONS en 1979

Contaminations de 1979

Contaminations de 1978

Contaminations antérieures à 1978 :
2=72 ; 5=75 ; 6=76 ; 7=77

Verger contaminés

